

Obstsorten für Hobbygärten. Teil 4: Strauchbeeren

Brombeere

Legende Typ: L = stachellos; M = mit Stacheln (botanisch korrekt!)

| Sorte, Typ | Reife | Geschmack In Vollreife | Anfällig für Rutenkrankheiten | Anfällig für Brombeergallmilbe |
|-------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Loch Ness, L (Nessy) | früh | süßsauerlich, aromatisch | gering | gering |
| Navaho, L | mittel | sehr aromatisch | gering | gering |
| Theodor Reimers, M | mittel | sehr aromatisch | gering | jahresbedingt |
| Asterina, L | früh | sehr süß (vor Vollreife!) | gering | gering |
| Asterix, L | früh | sehr süß | keine Angabe | keine Angabe |
| Chester, L | spät | süß | gering | gering |
| Black Satin, L | spät | säuerlich | gering | gering |

Spezielle Quellen

SIEGLER, H.: Brombeeren im Aufwind. www.kleingartenmagazin.de/h.siegler.brombeeren

WDR: Brombeeren selbst anbauen. August 2014. www.wdr.de/ratgeber/brombeersorten

GartenZeitung/ GartenFlora Nr.10/08 S. 81; 9/13 S. 68

Asterina. www.fruit-ag.ch/asterina/beschreibung

Black Satin. www.gruener.garten.shop-de/brombeeren

Heidelbeere

Legende Typ: U = kalkunverträglich; T = kalktolerant

| Sorte, Typ | Reife | Frucht | Geschmack | Wuchs |
|------------------|--------|------------|----------------|------------------|
| Reka Blue, U | früh | mittelgroß | süß-säuerlich | stark |
| Duke, U | früh | groß | aromatisch süß | aufrecht, stark |
| Berkely, U | früh | sehr groß | säuerlich | stark |
| Patriot, U | früh | sehr groß | aromatisch | stark |
| Puru, U | mittel | groß | aromatisch | mittelstark |
| Bluecrop, U | mittel | groß | säuerlich | mittelstark |
| Hardy Blue, T | mittel | mittelgroß | süß-säuerlich | stark |
| Elisabeth, T | spät | mittelgroß | aromatisch | aufrecht, straff |
| Sunshine Blue, T | spät | mittelgroß | aromatisch | buschig |
| Darrow, U | spät | sehr groß | säuerlich | mittelstark |

Spezielle Quellen

KRIEGHOFF, G.: „Kulturheidelbeeren im Garten“. Sächsisches Landesamt f. Umwelt 2012

www.gartenbaumschule-kraemer.de/Heidelbeeren

GartenZeitung 1/07 S.53; 5/07 S. 53; 8/10 S. 72; 1/11 S. 78

www.baumschule-horstmann.de/shop/heidelbeere

www.helmerts.de/pflanzen/vaccinium-hardyblue

Dr. Manfred Willkommen, Frankfurt (Oder), 03.15

Himbeere

Legende Typ: S = Sommerhimbeere; H = Herbsthimbeere

| Sorte, Typ | Reife | Fruchtfarbe | Geschmack | Bemerkungen |
|-------------------|------------|-------------|--------------|--|
| Marla, S | sehr früh | hellrot | gut | robust |
| Elida, S | früh | mittelrot | gut | robust |
| Meeker, S | mittel | dunkelrot | gut | anfällig für Rutenkrankheiten |
| Glen Ample, S | mittel | mittelrot | angenehm süß | anfällig für Rutenkrankheiten |
| Rubaca, S | mittel | hellrot | gut | widerstandsfähig geg. Wurzelfäule |
| Tulameen, S | mittelspät | hellrot | sehr gut | anfällig für Rutenkrankheiten |
| Schönemann, S | spät | dunkelrot | aromatisch | widerstandsfähig geg. Rutenkrankheiten |
| Glen Coe, S | spät | violett | aromatisch | widerstandsfähig geg. Rutenkrankheiten |
| Ruflava, S | spät | gelb | aromatisch | widerstandsfähig geg. Rutenkrankheiten |
| Autumn Bliss, H | spät | mittelrot | mittel | anfällig für Rutenkrankheiten |
| Polka, H | spät | mittelrot | gut | anfällig für Rutenkrankheiten |
| Aroma Queen, H | spät | mittelrot | süß | anfällig für Rutenkrankheiten |
| Himbotop, H | spät | mittelrot | mittel | |
| Autumn Amber, H | spät | apricot | aromatisch | robust gegen bodenb. Krankh. |
| Golden Everest, H | spät | gelb | süß | sehr ertragreich |

Anmerkungen

Herbsthimbeeren reifen ab Anfang August und sind meist madenfrei, weil Himbeerkäfer (*Byturu*) den Entwicklungszyklus abschließen, bevor Herbsthimbeeren reifen.

Rutenkrankheiten treten an Herbsthimbeeren nur selten auf, wenn die Ruten nach der Ernte sofort restlos am Boden abgeschnitten werden. Sie tragen am einjährigen Holz!

Spezielle Quellen

KRIEGHOFF, G.: „Himbeeren im Garten“. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Informationsschrift. 2012

Herbsthimbeeren. www.mdr.de/garten/herbsthimbeeren

GartenZeitung/ GartenFlora 3/02. S. 56; 10/08 S. 81; 9/12 S. 46; 6/13 S. 75.

GIRICHEV, V. und FLACHOWSKY, H.: „Himbeere. Widerstandsfähigkeit gegenüber der Himbeerrutenkrankheit“. Julius- Kühn- Institut, Dresden. Datenblätter 2014.1

Dr. Manfred Willkommen, Frankfurt (Oder) 03.15

Johannisbeere

Legende Typ: R = rot; S = schwarz; W = weiß

| Sorte, Typ | Reife | Geschmack | Anfälligkeit für Pilzkrankheiten | Anfälligkeit für Gallmilbe |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
| Jonkher van Tets, R | früh | säuerlich | gering | gering |
| Rolan, R | mittel | säuerlich | gering | gering |
| Rotet, R | mittel | säuerlich | gering | gering |
| Rovada, R | spät | säuerlich | gering | gering |
| Tatran, R | spät | säuerlich | gering | gering |
| Bona, S | sehr früh | sehr gut, mild | gering | gering |
| Fertöder, S | früh | sehr gut | gering | gering |
| Veloy, S | früh | aromatisch | gering | gering |
| Titania, S | mittel | säuerlich | gering | gering |
| Ometa, S | mittel | aromatisch mild | gering | gering |
| Ben Alder, S | spät | süß-säuerlich | gering | gering |
| Primus, W | früh | mild | gering | keine Angabe |
| Blanka, W | spät | aromatisch | gering | keine Angabe |

Spezielle Quellen

KRIEGHOFF, G.: „Johannisbeeren im Garten“. Sächsisches Landesamt für Umwelt 2012.
 Bayerische Gartenakademie: „Empfehlenswerte Beerenobst-Sorten“. 2006. Nr. 3161.
 GartenZeitung/ GartenFlora 4/10 S. 78; 6/12 S. 46; 4/13 S. 80
www.baumschule-horstmann.de/johannisbeere-ben-alder
www.wildobstschnecke.de/schwarze-johannisbeere-veloy

Stachelbeere

Sämtlich gegen Amerikanischen Stachelbeermehltau bezeichnet als widerstandsfähig.

| Sorte | Reife | Frucht | Geschmack | Stacheln (botan.:Dornen!) |
|----------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------|
| Risulfa | sehr früh | gelb | süß-säuerlich | viele kleine spitze Stacheln |
| Reflamba | sehr früh | grün | säuerlich | sehr harte Stacheln |
| Reverta | sehr früh | grüngelb | sehr süß | viele kleine spitze Stacheln |
| Xenia | früh | hellrot | orangeartig | fast stachellos |
| Remarka | früh | dunkelrot | mild säuerlich | stark bestachelt |
| Rokula | früh | rot | süß-säuerlich | fast stachellos |
| Rixanta | mittel | gelb | süß-säuerlich | einfach bestachelt |
| Pax | mittel | rot | süß-säuerlich | fast stachellos |
| Spinefree (=Captivator) | mittel | rot | aromatisch | fast stachellos |
| Mucurines | spät | grün | sehr süß | dicht bestachelt |
| Hinnonmäki | spät | gelb | süß-säuerlich | schwach bestachelt |
| Redeva | spät | dunkelrot | süß | fast stachellos |

Spezielle Quellen

GartenZeitung 3/02 S. 54; 7/08 S. 51 (KRIEG, R.- Bundessortenamt)
 Bayerische Gartenakademie: Empfehlenswerte Beerenobst-Sorten. 2006. Merkblatt 3161.
www.baumschule-horstmann.de/stachelbeeren

Dr. Manfred Willkommen, Frankfurt (Oder) 03.15